

BCGワクチン予防接種を受けた皆様へ

接種後の注意事項


- 接種は左上腕部にしています。今日から入浴は可能ですが、接種部位をこするなど、刺激しないように注意してください。
- 接種時に管針を強く押し付けるため、数日間赤みが残ることがありますが、腫れや膿が見られなければ、特に心配はいりません。

接種後の反応について

- 接種後、1か月頃から接種部位（針あと）に赤いポツポツができ、一部に白い膿をもってきたりしますが、これは正常な反応です。
- 個人差はありますが、3か月頃までにはかさぶたもほとんどとれます。

正常な反応

※画像は一例です。
反応には個人差があります。



接種直後

接種4週

6週

2ヵ月

4ヵ月

- すでに結核に感染しているお子さんにBCGを接種すると、通常よりも早い時期に接種したところに強い反応がでます。これを「コッホ現象」と呼びます。
- 接種当日や翌日など、早い時期に赤く腫れあがったり、膿が見られる場合は、コッホ現象の可能性があるので、健康支援課へお電話をお願いします。

コッホ現象

※画像は一例です。
反応には個人差があります。



接種後2日

接種後5日

接種後7日

※コッホ現象の可能性が高い場合は、医療機関を受診し、結核感染の有無の検査（ツベルクリン反応検査）を行います。

コッホ現象が疑われる場合は、まずは市役所健康支援課（☎32-6407）へお電話ください。